

NOM LATIN		NOM COMMUN	ZONE	SOL	EXPOSITION	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	MÉTHODE DE SEMIS
ARBRES ET ARBUSTES													
Acer saccharum	Érable à sucre	3	frais										2
Betula populifolia	Bouleau Rouge	1	frais ou sec										6
Juglans nigra	Noyer Noir	4b	frais										12
Picea mariana	Épinette noire	1a	humide										2
Quercus rubra	Chêne Rouge	3a	frais ou humide										13
Aronia melanocarpa	Gueules noires	1	frais, humide ou détrempé										2
Cephalanthus occidentalis	Bois noir	4	humide ou détrempé										1
Cornus alternifolia	Cornouiller à feuilles alternes	3	frais ou humide										9
Cornus stolonifera	Hart rouge	1	frais ou sec										2
Hamamelis virginiana	Café du diable	4b	frais ou humide										7
Ilex verticillata	Houx verticillé	3	frais, humide ou détrempé										2
Nemopanthus mucronatus	Faux houx	2	frais, humide ou détrempé										7
Physocarpus opulifolius	Bois à sept écorces	2a	frais, humide ou sec										6
Prunus virginiana	Cerisier à grappes	2	frais ou sec										7
Rhus typhina	Vinaigrier	3	frais ou sec										15
Sambucus canadensis	Sureau blanc	3	frais										10
Viburnum trilobum	Pimbina	2	frais										10
GRAMINÉES													
Calamagrostis canadensis	Foin bleu	3	Frais, humide ou détrempé										3
Hierochloe odorata	Foin d'odeur	3	frais										5
Juncus effusus	Jonc épars	3	humide ou détrempé										8
Scirpus atrovirens	Scirpe noirâtre	3	humide ou détrempé										8
Spartina pectinata	Herbes à liens	3	frais ou humide										19
GRIMPANTES													
Celastrus scandens	Bourreau des arbres	3b	frais										11
Clematis virginiana	Herbe aux gueux	3	frais										6
Parthenocissus quinquefolia	Vigne vierge	2	frais										6
Vitis riparia	Vigne sauvage	2	frais, humide ou sec										6

FLORAISON												MÉTHODE
NOM LATIN	NOM COMMUN	ZONE	SOL	EXPOSITION	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	DE SEMIS
VIVACES												
Anaphalis margaritacea	Immortelle	3	sec									8
Aquilegia canadensis	Gants de Notre-Dame	3	frais ou sec									8
Asclepias incarnata	Asclépiade rouge	3	frais, humide ou détrempé									5
Asclepias syriaca	Petits cochons	2	Frais ou sec									5
Aster novae-angliae	Aster de la Nouvelle-Angleterre	3	frais ou sec									1
Chelone glabra	Galane glabre	3	frais, humide ou détrempé									7
Epilobium angustifolium	Bouquets rouges	2	frais ou sec									20
Eupatorium maculatum	Eupatoire maculée	3	frais, humide ou détrempé									8
Helenium autumnale	Hélénie automnale	4	frais ou humide									8
Heliopsis helianthoides	Héliopsis faux-hélianthe	4	frais									4
Hypericum pyramidatum	Millepertuis pyramidal	4	frais ou humide									8
Iris versicolor	Iris versicolore	2	frais, humide ou détrempé									16
Lathyrus maritimus	Pois de mer	3	sec									17
Lilium canadense	Lis du Canada	4	frais ou humide									18
Monarda fistulosa	Monarde fistuleuse	4	frais									1
Oenothera victorinii	Onagre de Victorin	2	sec									3
Phytolacca americana	Phytolaque d'Amérique	5	frais ou humide									14
Solidago canadensis	Bouquets jaunes	3	frais ou sec									6
Verbena hastata	Verveine hastée	4	frais, humide ou détrempé									8
Zizia aurea	Zizia doré	3	frais, humide ou détrempé									7

Méthode de semis - Semences Marie-Victorin

- 1) Aucun prétraitement requis. Semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol.
- 2) Aucun prétraitement requis. Semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré; la germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 3) Aucun prétraitement requis. Semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Semer en surface, car les semences ont besoin de lumière pour germer. Ne pas terreauter après le semis.
- 4) Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour 30 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol.

- 5) Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laissé en chambre froide ou au frigo pour 30 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 6) Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laissé en chambre froide ou au frigo pour 30 à 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 7) Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laissé en chambre froide ou au frigo pour 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 8) Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour 30 à 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Semer en surface, car les semences sont très petites ou ont besoin de lumière pour germer. Ne pas terreauter après le semis. Ces semences peuvent être mêlées à du talc ou du sable pour obtenir un semis uniforme.
- 9) Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laissé en chambre froide ou au frigo pour 30 à 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira après deux périodes hivernales (18 à 20 mois).
- 10) Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laissé en chambre froide ou au frigo pour au moins 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira après deux périodes hivernales (18 à 20 mois).
- 11) Faire tremper les semences 24 heures dans l'eau préalablement bouillie 5 minutes. Puis mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laissé en chambre froide ou au frigo pour au moins 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 12) Ne pas laisser sécher les graines. Faire tremper les semences 24 heures dans de l'eau préalablement bouillie 5 minutes. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour 30 à 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 13) Ne pas laisser sécher les graines. Faire tremper les semences 48 heures dans de l'eau préalablement bouillie 5 minutes. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour 30 à 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 14) Griffer légèrement la surface des semences en les frottant entre deux papiers sablés. Puis, mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour au moins 30 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 15) Griffer légèrement la surface des semences en les frottant entre deux papiers sablés. Puis, mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour au moins 90 jours. Ensuite,

semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.

- 16) Griffer légèrement la surface des semences en les frottant entre deux papiers sablés. Faire tremper les semences 24 heures dans de l'eau préalablement bouillie 5 minutes. Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour au moins 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 17) Faire tremper les semences 24 heures dans l'eau préalablement bouillie 5 minutes. Puis mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour 30 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. Ou, semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira le printemps suivant ou ultérieurement.
- 18) Semer à l'extérieur à l'automne à l'endroit désiré. La germination se produira après deux périodes hivernales (18 à 20 mois).
- 19) Mélanger les semences à un volume égal de sable ou de vermiculite humide. Placer le tout dans un sac de plastique à fermeture à glissière. Laisser en chambre froide ou au frigo pour 30 à 90 jours. Ensuite, semer à l'endroit désiré dès qu'il n'y a plus de risque de gel au sol.
- 20) Aucun prétraitement requis. Semer à l'endroit désiré dès que la température est propice. Semer en surface, car les semences sont très petites ou ont besoin de lumière pour germer. Ne pas terreauter après le semis. Ces semences peuvent être mêlées à du talc ou du sable pour obtenir un semis uniforme.